



SUMI AGRO

Etkisi Uzun Bekleme Süresi Kısa

200 g/l Penthiopyrad
SC (Süspansiyon Konsantre)
Grubu: C2:7

Yepyeni bir aktif madde içeriği ile Elma karalekesi, Kurşuni küf, Külleme, Beyaz çürüklük, Sebze Fidelerinde Çökerten ve Kök çürüklüğü, Soğan pası, Çilek kök çürüklüğü hastalıklarını kontrol eden, hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte, çok kısa hasat bekleme süreli yepyeni bir fungusittir.

**YENİ
AKTİF
MADDE**

**KORUYUCU
VE TEDAVİ
EDİCİ**

**ÇOKLU
HASTALIK
KONTROLÜ**

Sumi Agro Türkiye bir Sumitomo Corporation şirkettir.





APHET'İN ÖZELLİKLERİ

- Penthiopyrad sporulasyonu, spor çimlenmesini, hif büyümesini engeller.
- Mitokondride, Kompleks II'de elektron taşınımını engelleyerek etki eder.
- Aphet Japonya'da oldukça popüler olan yepyeni bir fungusittir.
- Diğer fungusit grupları ile çapraz direnç göstermez.
- Fungusun birden fazla gelişme dönemine etkilidir.
- Geniş hastalık spektrumuna sahiptir.
- Uygulama ile hasat arasındaki süre serada yetişen Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kornişon, Çilek ve Kavunda ayrıca Soğan ve Sarımsakta 1 gündür.

Tavsiye Tablosu

Bitkiler	Zararlı Organizma	Kullanım Dozu	Son Uyg. ile Hasat Arası Süre
Domates (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml/ 100 L su	1 gün
	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	125 ml/ 100 L su	1 gün
	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp., Rhizoctonia solani.</i>)	250 ml/da (damla sulama)	-
Biber (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml/ 100 L su	1 gün
	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	125 ml/ 100 L su	1 gün
	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp., Rhizoctonia solani.</i>)	250 ml/ da (damlama sulama)	-
Patlıcan (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml/ 100 L su	1 gün
	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	125 ml/ 100 L su	1 gün
	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp., Rhizoctonia solani.</i>)	250 ml/da (damla sulama)	-
Hıyar, Kornişon (Sera)	Beyaz Çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	125 ml/ 100 L su	1 gün
	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum,</i> <i>Podospaera xanthii</i> (= <i>Sphaerotheca fuliginea</i>))	125 ml/ 100 L su	1 gün
Soğan, Sarımsak	Soğan Pası (<i>Puccinia porri</i>)	125 ml / da	1 gün
Çilek (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml/ 100 L su	1 gün
	Çilek Kök Çürüklüğü (<i>Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum,</i>)	250 ml/da (damla sulama)	-
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	100 ml/100 L su	28 gün
Kavun	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Rhizoctonia spp...</i>)	250 ml/da (damla sulama)	-

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.

Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Maslak Mahallesi AOS 55 Sk. 42 Maslak
B Blok Sit. No:4/717 Sarıyer / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 276 10 91
Fax : 0 (212) 276 10 92
www.sumiagro.com.tr

