



SUMI AGRO

Kaliteli Üretimde Falgro Etkisi

1 Tablet 1 g saf gibbrellic asit (GA3)

MEYVE
TUTUMUNDA
İYİLEŞME

ERKENÇİLİK
VE
VERİM
ARTIŞI

SUDA
KOLAY VE
HIZLI ERİME

 **falgro**[®]

Sumi Agro. Sumitomo Corporation'ın bir şirketidir.

FALGRO'NUN AVANTAJLARI

- Suda çok kolay ve hızlı eriyebilme özelliğine sahiptir.
- Kullanıldığı bitkilerde amaca yönelik olarak kaliteyi, çiçeklenmeyi, meyve tutumunu ve verimi artırır.
- Erkencilik sağlar.
- Süs bitkilerinde uzun sap ve iri çiçek elde etmek amacıyla kullanılır.
- Marulda göbek bağlamayı teşvik eder.

FALGRO® Tavsiye Tablosu		
Bitki Adı	Kullanım Amacı ve Dönemi	Dozu 100 l suya
Sofralık Çekirdeksiz Üzüm	1. uygulama çiçeklenmeden önce salkımlar 4-8 cm boyda iken, salkımların boyunu uzatmak amacıyla uygulanır.	2 tablet
	2. uygulama tam çiçeklenme döneminde yani çiçek taç yapraklarının %70-80'inin döküldüğü devrede, dane seyreltmesi amacıyla uygulanır.	2 tablet
	3. uygulama çiçeklenmeden sonra daneler 3 mm saçma iriliğine ulaştığında, dane irileştirilmesi amacıyla uygulanır.	2 tablet
Kurutmalık Çekirdeksiz Üzüm	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi artırmak amacıyla uygulanır.	1 tablet
Mandarin	Satsuma ve Klemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu arttırmak ve verim artışı sağlamak amacıyla çiçeklerin %75-80'inin açtığı devrede uygulanır.	1,5 tablet
Portakal	Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için, çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra uygulanır.	2 tablet
	Washington Navel çeşidinde meyvelerin ağaçta kalma sürelerini uzatmak ve hasadı düzenlemek amacıyla meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede uygulanır.	1-2 tablet
Limon	Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde, meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak amacıyla uygulanır.	1 tablet
Greyfurt	Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacıyla meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede uygulanır.	1 tablet
Armut	Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde verimi artırmak için çiçeklerinin %30'unun açtığı devrede uygulanır.	1,5-2 tablet
	Ayrıca çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için donlardan en geç 2 gün sonra uygulanır.	0,5-2 tablet
Kiraz ve Vişne	Hasadı geciktirmek, iri ve parlak renkli tane elde etmek amacıyla renk değişiminin başladığı dönemde uygulanır.	1-2 tablet
Şeftali	Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak uygulama bir sonraki yıl çiçek açımını 3-7 gün geciktirmekte ve şeftalilerin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini engellemektedir.	1,5 tablet
Çilek	Anaç bitki 1-6 yapraklı iken, fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğalması için kullanılır. Ayrıca çileklerde mahsule yatmayı sağlamak, verimi artırmak ve meyveleri irileştirmek için çiçeklenmeden 3-4 hafta önce uygulanır.	5 tablet
Enginar	Hasadı 1-2 ay erkene almak, düzgün şekilli ve iri ürün elde etmek amacıyla bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına uygulanır.	2,5-5 tablet
Patates	Tohumluk patatesler dikilmeden önce FALGRO ile hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir, böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlar.	2 tablet
Marul	Göbek bağlamayı teşvik etmek için hasattan 7-15 gün önce uygulanır.	2 tb/100 l su veya 1 tb/da
Biber	Verimi artırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra uygulanır.	3 tablet
Süs Bitkileri	Kesme çiçekçilikte uzun sap ve iri çiçek elde etmek için krizantem, gül, sıklamen ve karanfilde kullanılır.	4-15 tablet

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Maslak Mahallesi AOS 55 Sk. 42 Maslak
B Blok Sit. No:4/717 Sarıyer / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 276 10 91
Fax : 0 (212) 276 10 92
www.sumiagro.com.tr

