



SUMI AGRO

Dayanıklılık Kıran Hızlı Etki

26,5 g/l Pyraflufen ethyl
EC (Emülsiyeye Olabilen Konsantre)
Grubu: E

Kabuki, bazı yaygın herbisit gruplarına karşı dayanıklılık geliştirmiş yabancı otlarda etkili bir herbisittir.

ETKİLİ
KORUMA

HIZLI
KONTROL

GÜVENLİ
UYGULAMA

Sumi Agro. A company of Sumitomo Corporation.

KABUKI



KABUKİ'NİN AVANTAJLARI

- Diğer bazı sık kullanılan herbisit gruplarına dayanıklılık kazanmış yabancı otları kontrol eder.
- Oldukça hızlı etki gösterir.
- Toprakta kalıcılığı yoktur, sonradan ekimi yapılacak kültür bitkisine zarar vermez.

Kullanıldığı Bitkiler ve Yabancı Otlar			
Bitkiler	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Limon, Portakal, Mandarin	Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) Boynuzlu yoğurtotu (<i>Galium tricornutum</i>) Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Küçük çiçekli ebegümeci (<i>Malva parviflora</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	30 ml/da çıkış sonrası 4-6 yapraklı dönem	-
Nar	Çoban değneği (<i>Polygonum spp.</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>) Kuşotu = Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Meyan otu (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) Şahter (<i>Fumaria spp.</i>)	30 ml/da çıkış sonrası 4-6 yapraklı dönem	90 gün
Patates	Yaprak Kurutucu	80 ml/da Hasat öncesi olgun yumru dönemi	10 gün

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Maslak Mahallesi AOS 55 Sk. 42 Maslak
B Blok Sit. No:4/717 Sarıyer / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 276 10 91
Fax : 0 (212) 276 10 92
www.sumiagro.com.tr

KABUKİ