

Yaprakbitlerine Karşı Güvenlik Duvarınız!

% 50 Flonicamid
WG (Suda Dağılılabilen Granül)
Grubu: 29

Teppeki dayanıklılık kazanmış yaprakbiti türlerini kontrol altına alarak,
seralarınızda uzun süreli etki sağlar!

ANİ VE
UZUN
SÜRELİ
ETKİ

SİSTEMİK VE
TRANSLAMİNAR
ETKİ

FAYDALILARA
ZARARSIZ



TEPPEKİ'NİN ÖZELLİKLERİ

- Sistemik ve translaminar özelliğe sahip bir ilaçtır.
- Yeni bir kimyasal gruba dahildir. Bu nedenle ilaçlara karşı dayanıklılık kazanmış yaprakbiti türlerine karşı da etkilidir.
- Faydalı böceklere etkisi yok denecek oranda azdır ve çevre dostudur.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki	Zararlı Organizma Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su (Ergin, nimf)	3 gün
Biber (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su (Ergin, nimf)	3 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su (Ergin, nimf)	14 gün
Hıyar (Sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su (Ergin, nimf)	3 gün
Turunçgil*	Turunçgil siyah yaprakbiti (<i>Toxoptera aurantii</i>), Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	8 g/100 l su (Ergin, nimf)	56 gün
Pamuk	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	20 g/da (Ergin,nimf)	21 gün
Pamuk	Pamukta yaprakpireleri (<i>Empoasca decipiens</i> , <i>Asymmetrasca decedens</i>)	20 g/da (Ergin,nimf)	21 gün
Kabak (sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su (Ergin, nimf)	3 gün
Kornişon (sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su (Ergin, nimf)	3 gün

* Turunçgillerde faydalılara karşı etkisiz olduğu tespit edilmiştir.

** Bir sezonda birden fazla uygulamayınız.

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.

Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

**Maslak Mahallesi AOS 55 Sk. 42 Maslak
B Blok Sit. No:4/717 Sarıyer / İSTANBUL**

Tel : 0 (212) 276 10 91

Fax : 0 (212) 276 10 92

www.sumiagro.com.tr

TEPPEKİ