










Yumuşak Çekirdekli Meyveler Bitki Besleme Programı

									
	Tomurcuk Dönemi	Pembe Tomurcuk Dönemi	Çiçeklenme Başlangıç Dönemi	Tam Çiçek Dönemi	Petal Yaprakların Dökülmesi Dönemi	Meyve Tutumu Dönemi	Meyve İrileşme Dönemi	Hasat Dönemi	Hasat Sonrası Dönemi
CROMALIV							200 ML/100 LT (2. uygulama 6-10 gün sonra)		
BUD BUILDER	0,5-1kg/Da								1 Kg/Da
ZINTRAC 700	0,1-0,2 L/Da								0,1-0,2 L/Da
EUROBORE		0,2 L/Da (Zintrac kullanılan bahçelerde)			0,2 L/Da				0,2 L/Da (Zintrac kullanılan bahçelerde)
SIAPTON		200-400 MI/100 L su					200-400 MI/100 L su		
SENIPHOS					1 L/Da (10-14 gün aralıklarla en az 3-8 uygulama)				
CALTRAC 160						0,5-1 L/Da (7-14 gün aralıklarla)			
ALEXIN K		250 G/100 L su					250 G/100 L su		
DIMMER	1,5 Kg / 1 Ton su 14 günde bir ihtiyaç duyuldukça uygulanır.								
TETSIRON GRANDE	500 Gr-3 KG/Da Kökten alımın ve fotosentez aktivitesinin en yüksek olduğu zamanda her 7-15 günde bir uygulayın.								

Toprak Uygulaması

Yaprak Uygulaması