







Sert Çekirdekli Meyveler Bitki Besleme Programı

						
	Tomurcuk Dönemi	Beyaz Tomurcuk Dönemi	Petal Yaprakların Dökülmesi Dönemi	Çekirdek Sertleşme Dönemi	Meyve Gelişim Dönemi	Hasat Sonrası Dönemi
CROMALIV					200 ML/100 LT (2. uygulama 6 -10 gün sonra)	
GREENSTIM					2 Kg/Ton su	
BUD BUILDER	0,5-1Kg/Da					1Kg/Da
ZINTRAC 700	0,1-0,2 L/Da					0,1-0,2 L/Da
EUROBORE		0,1-0,2 L/Da (Zintrac kullanılan bahçelerde)				0,1-0,2 L/Da (Zintrac kullanılan bahçelerde)
SIAPTON		200 - 300 MI / 100 L su		200 - 300 MI / 100 L su		
SENIPHOS			1 L/Da			
CALTRAC 160				0,5-1 L/Da dozunda minimum hasattan 7-14 gün önce 2 uygulama		
ALEXIN K						250 G/100 L su
ALEXIN K						500-700 G/Da
WELGRO POTASIO					1,5-2,5 KG/Ton su	
DIMMER	1,5 Kg / 1 Ton su 14 günde bir ihtiyaç duyuldukça uygulanır.					
TETSIRON GRANDE	500 Gr-3 Kg/Da Kökten alımın ve fotosentez aktivitesinin en yüksek olduğu zamanda her 7-15 günde bir uygulayın.					

Toprak Uygulaması

Yaprak Uygulaması