









Fındık Bitki Besleme Programı

| | ŞUBAT MART | ŞUBAT MART | MART ORTASI | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN-TEMMUZ | AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM | KASIM-ARALIK |
|-----------------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | Çiçeklenme Dönemi | Çiçeklenme Dönemi | Tomurcuk Patlama | Yapraklama Dönemi | Fındık Gelişim Dönemleri | Fındık Gelişim Dönemleri | Hasat Sonrası, Yaprak Dökümü Öncesi | Sonbahar Dönemi |
| CILUS PLUS | | | 20G/Da ya da (1 ay ara ile iki uygulama) | | | | | 20G/Da ya da (1 ay ara ile iki uygulama) |
| | | | Ya Da 0,5-1G Ağaç Bası (1 ay ara ile 2 uygulama) | | | | | Ya Da 0,5-1G Ağaç Bası (1 ay ara ile 2 uygulama) |
| BUD BUILDER | 250 G - 500 G/Da | | | | | | 250 G/Da | |
| EUROBORE | | | 100 MI/Da | | | | | |
| SAFE N | (Çiçeklenme Öncesi) 500 MI -1 Lt/Da dozlarında (Gerekli hallerde çiçeklenmeden 30 gün sonra tekrarlanmalı) | | | | | | 500 MI - 1 Lt/Da dozlarında | |
| SIAPTON | | | 250 MI - 400 MI/100 L *(1.uygulama 3 yapraklı dönemde, 2.uygulama 10 gün sonra) | | | 250 MI - 400 MI/100 L.* | | |
| ALEXIN K | | | 150 G - 250 G/100 L (ilkbahar uygulaması) | | | | 150 G - 250 /100 L | |
| SENIPOS | | | | | 400 MI - 500 MI/Da | | | |
| CALTRAC | | | | | 500 MI/Da (2 uygulama; Hasattan 45 gün ve 30 gün önce) | | | |
| TETSIRON GRANDE | 500 Gr-3 Kg/Da Kökten alımın ve fotosentez aktivitesinin en yüksek olduğu zamanda her 7-15 günde bir uygulayın. | | | | | | | |

Kök Bölgesine Hidro Enjeksiyon
 Toprak Uygulaması
 Yaprak Uygulaması