







# Narenciye Bitki Besleme Programı

						
	Erken Gelişme Dönemi	Tomurcuklanma Dönemi	Çiçeklenme Dönemi	Meyve Tutumu Dönemi	Meyve İrileşme Dönemi	Hasat Sonrası Dönemi
BEETRAC	300-500 G/Da					
GREENSTIM			200-300 G/100 L Taç yapraklarının %90-100'ü düştüğünde tek bir uygulamayada %75-100'ü düştüğünde 2 uygulama			
ALEXIN K	250 G/100 L					
BUD BUILDER		0,5 - 1 Kg/Da (Tomurcuk patlaması ile çiçeklenme başlangıcı arası)		1 Kg/Da		
EUROBORE		300 MI/Da				
ZINTRAC 700		100 MI-200 MI/Da				
SIAPTON			150-300 MI/100 L			
SENIPOS				1 L/Da		
CALTRAC 160					1 L/Da 3 uygulama	
WELGRO POTASIO					150-250 G/100 L Su	
DIMMER	1,5 Kg / 1 Ton Su 14 günde bir ihtiyaç duyuldukça uygulanır.					
CITRUS PLUS			20 G/Da			
TETSIRON GRANDE	500 Gr-3 Kg/Da Kökten alımın ve fotosentez aktivitesinin en yüksek olduğu zamanda her 7-15 günde bir uygulayın.					

Toprak Uygulaması

Yaprak Uygulaması